

nr 1-17, 19-31

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA  
STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES  
DU  
LANGUEDOC-ROUSSILLON

D. L.


27 JAN 1954

MONTPELLIER. 16, Rue de la République. TEL. M2. 58-72

2<sup>ME</sup> ANNÉE

N: 1

Janvier 1954



no Jo. 10436

#29



## Remarques importantes

A partir de Janvier 1954, nous avons profondément remanié la carte des zones d'avertissements. Les 3 divisions établies il y a quelques années tenaient compte des postes d'observations climatologiques autant que de la répartition des abonnés. L'augmentation du nombre de cultures réclamant des avertissements agricoles, une meilleure implantation des postes météorologiques, la création d'un réseau de correspondants, nous permettent de mieux tenir compte des nécessités particulières à chaque région.

Nos abonnés vont trouver 6 zones principales schématisées sur la carte ci-contre. Pour connaître leur situation exacte nous les prions de se reporter au répertoire des pages 4 - 5 et 6 qui indique l'affiliation de chaque canton à une zone précise.

La zone II est subdivisée en 3. Ils nous a paru nécessaire de fractionner une région qui a une unité de la pluviométrie et des températures, mais où par contre le régime des vents est diversifié (influence des vents atlantiques et du Mistral).

0 0  
0

Chaque fois que le bulletin portera à gauche la mention :  
A V E R T I S S E M E N T , en regard nous indiquerons la ou les zones intéressées.

Exemple :

A V E R T I S S E M E N T

Zones I - II B  
III - et IV

0 0  
0

Dans un prochain bulletin nous indiquerons la liste des produits types conseillés pour obtenir les résultats les meilleurs dans la lutte antiparasitaire.

0 0  
0


A la demande de nombreux abonnés nous publierons également un tableau des mélanges de produits; cette pratique est éminemment recommandable pour diminuer les frais de main-d'oeuvre; mais elle réclame diverses précautions que nous rappellerons.

0 0  
0

En 1954, les recommandations et prescriptions valables pour toute l'année seront imprimées sur feuilles jaunes que nos abonnés auront la possibilité de regrouper.

.../...





- |        |   |
|--------|---|
| +++++  | 1 |
| .....  | 2 |
|        | 3 |
| =====  | 4 |
| ////// | 5 |
| ccccc  | 6 |

I - ZONE LITTORALE

PYRENEES-ORIENTALES

Argelès s/ mer  
Perpignan (E et O)  
Rivesaltes  
St-Laurent de la Salanque

AUDE

Sigean  
Narbonne  
Coursan

CARD

Aigues-Mortes

HERAULT

Béziers (1 et 2)  
Servian  
Pézenas  
Florensac  
Agde  
Mèze  
Frontignan  
Montpellier (2-2-3)  
Mauguio  
Lunel  
Sète

II - ZONE SUB-LITTORALE

-A-

PYRENEES-ORIENTALES

Pratt de Mollo  
Arles s/ Tech  
Céret  
Prades  
Vinça  
Millas  
Thuir  
Sournia  
St Paul de Fenouillet  
Latour de France

HERAULT

Olonzac  
Ginestas  
Capestang  
St-Pons  
St-Chinian

AUDE

Axat  
Quillan  
Couiza  
Tuchan  
Mouthounet  
Limoux  
Lagrasse  
Durban  
St Hilaire  
Carcassonne (4)  
Capendu  
Lézignan Corbières  
Conques  
Peyrac Minervois

-B-

GARD

Sommières  
Sauve  
Quissac  
St-Mamert  
Lédignan  
St-Chartes  
Vézénobres

HERAULT

Murviel  
St Gervais Ville  
Roujan  
Clermont l'Hérault  
Lodève  
Aniane  
Les Matelles  
Castries

Olargues  
Bédarieux  
Lunas  
Montagnac  
Gignac  
St-Martin de Londres  
Claret

.../...



II - ZONE SUB-LITTORALE (Suite)

-C-

GARD

Vauvert	St-Gilles
Nîmes (1-2-3)	Beaucaire
Marguerite	Aramon
Remoulins	Villeneuve les Avignon
Uzès	Roquemaure
Lussan	Bagnols s/ Cèze
Pont St-Esprit	

III - ZONE D'ALTITUDE et de  
CLIMAT MEDITERRANEEN

PYRENEES-ORIENTALES

Saillagousse  
Mont-Louis  
Olette

HERAULT

Le Caylar  
Ganges

GARD

Trèves	Le Vigan
Alzon	St-André de Valborgne
Vallemaugues	Sumène
St-Jean du Gard	Lasalle
Anduze	St-Hippolyte du Fort
Genolhac	Bessèges
La Grand-Combe	Alès (E et O)
St-Ambroix	Barjac

AVEYRON

Réquista  
Belmont s/Rance  
St-Rome du Tarn  
Camarès  
Peyreleau

St-Cernin s/Rance  
St-Beauzély  
St-Affrique  
Millau

LOZERE

Massegros	Meyrueis
St-Enimie	Florac
Le Pont de Montvert	Barre des Cévennes
St-Germain de Calberte	

IV - ZONE ATLANTIQUE

AUDE

Chalabre  
Belpech  
Montréal  
Castelnaudary  
Saissac

Alaigne  
Fanjeaux  
Salles s/Ihers  
Alzonne  
Mas Cabardès

V - ZONE ATLANTIQUE D'ALTITUDE

AUDE

Belcaire

HERAULT

La Salvetat

AVEYRON

Najac  
Naucelle  
Villeneuve  
Rieupeyroux  
Decazeville  
Rodez  
Entraygues s/Tryyère  
Laissac  
St-Geniez

La Salvetat  
Cassagne Begonhès  
Villefranche de Rouergue  
Rignac  
Conques  
Le Pont de Salars  
Estaing  
Vezins  
Campagnac

Sauveterre  
Capdenac Gare  
Montbazens  
Aubin  
Marcillac d'Aveyron  
Salles Curans  
Bozouls  
Espalion  
Sévérac le Château

VI - ZONE DU MASSIF CENTRAL

AVEYRON

St-Amans  
Mur de Barrez  
Laguiole

St-Chély d'Aubrac  
Ste Geneviève s/Argence

LOZERE

Fournels  
Malzieu-Ville  
Chanac  
St-Amans la Lozère  
Langogne

Lasbinal  
Aumont  
Mende  
Grandrieu  
Le Bleyrnard

St-Germain du Teil  
Marvejols  
St-Alban s/Limagnole  
Châteauneuf de Randon

0 0  
0

Nous prions nos abonnés résidant dans la zone VI de bien vouloir nous le signaler en nous indiquant les cultures qu'ils désirent protéger.

0 0  
0

La division en zones n'intéresse pas le vignoble

Les avertissements viticoles reproduits dans le bulletin à la page 2 avec la signature de Monsieur BERNON ne concernent que les 4 départements côtiers : Gard, Hérault, Aude, et Pyrénées-Orientales.

Les viticulteurs de la région de Marcillac et de la vallée du Lot reçoivent des bulletins spéciaux portant un n° Bis.

.../...



Le traitement d'hiver ne paraît plus aussi nécessaire qu'autrefois sur les arbres à pépins dans les régions septentrionales; en effet des traitements de printemps, absolument indispensables sur ces espèces, permettent de stopper l'évolution des parasites que l'on détruisait, dans le passé, par les traitements d'hiver.

Dans les régions méridionales, cette suppression des traitements d'hiver n'est, à notre avis, à encourager que dans le cas de vergers d'arbres à pépins très bien tenus très bien équipés au point de vue matériel de traitements et où les traitements de printemps sont obligatoirement effectués.

Les traitements d'hiver doivent être cependant effectués au moins tous les 3-4 ans et plus fréquemment sur les vieux arbres, sur les arbres qui ont été négligés et sur les arbres recouverts de mousses, de lichens et de cochenilles.

Sur les arbres à noyaux, il convient de distinguer :

- d'une part : l'abricotier
- d'autre part : le pêcher et le prunier

Sur abricotier, les traitements d'hiver doivent être effectués au moins tous les 3-4 ans surtout lorsqu'il s'agit d'arbres âgés et ayant été attaqués par le monilia (chancres).

Sur le pêcher et le prunier, il convient de tenir compte que plusieurs espèces de pucerons hivernent à l'état d'oeufs sur les rameaux.

Ces oeufs peuvent être détruits par le traitement d'hiver à condition que le traitement soit effectué dans les quelques jours qui précèdent le débourrement (c'est le moment où les oeufs sont les plus sensibles).

Sur pêcher et prunier, nous pensons, jusqu'à preuve du contraire, qu'il est prudent d'effectuer le traitement d'hiver. Dans les régions méridionales on peut redouter des périodes de pluie et de vent, au printemps, qui interdisent les traitements pendant quelquefois plusieurs semaines, et on risque dans ces conditions de ne pouvoir traiter que trop tard lorsque le verger est déjà envahi par les pucerons, en particulier le puceron vert le parasite le plus redoutable du pêcher.

Dans le cas de vergers envahis par les cochenilles (Pou de San José, Diaspis Leperii..), le maintien des traitements d'hiver s'impose.

Produits à utiliser :

- 1° - Produits décapants, insecticides et ovicides : Huile d'anthracène
- 2° - Produits insecticides et ovicides :
  - Huile blanche d'hiver
  - Huiles jaunes (Huile blanche ou Huile d'anthracène + colorants)
  - Huiles + Parathion
  - Colorants nitrés

Observations -

Il est conseillé, d'ici le débourrement, de refaire un traitement cuprique sur pêcher, en utilisant soit : la Bouillie Bordelaise  
l'Oxychlorure de cuivre  
le sulfate basique de cuivre.

Dans les vergers de pêchers greffés sur pêcher, et d'abricotiers greffés sur abricotier, qui ont été inondés, il est conseillé d'attendre un avertissement pour effectuer les traitements d'hiver avec des huiles.

P. 32

Ils sont dirigés contre les cochenilles de la vigne  
l'esca ou apoplexie parasitaire.

La lutte contre les cochenilles de la vigne est difficile, elles sont le plus souvent protégées sous les écorces. Les traitements doivent être effectués de préférence avec des pulvérisateurs donnant une pression de 6 à 8 kgs avec beaucoup de soin et d'attention.

Contre les cochenilles de la vigne on peut utiliser :

- des huiles d'anthracène aux doses indiquées par les fabricants
- des huiles d'anthracène + colorants aux doses indiquées par les fabricants
- des huiles d'anthracène + huiles de pétrole aux doses indiquées par les fabricants.

La lutte contre l'esca consiste en des pulvérisations :

- d'arsénite de soude aux doses indiquées par les fabricants.

Ce traitement doit être fait pendant la période de repos et de préférence 10-15 jours après la taille.

Le développement de l'esca nous paraît inquiétant dans les vieilles vignes, là où le traitement d'hiver à base d'arsénite de soude n'a pas été effectué depuis quelques années.

Attention - L'arsénite de soude est un poison violent qui doit être manipulé et utilisé avec les précautions prévues par la loi (ne pas déboucher les jets en soufflant, éviter le contact prolongé de la bouillie avec la peau, ne pas fumer pendant le traitement, etc...).

Reproduction ou adaptation réservées - Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles  
du Languedoc Roussillon - 16, rue de la République - MONTPELLIER  
Autorisation du 23 Janvier 1953 - Le Gérant : R. BERTRAND

Ce bulletin est le dernier adressé aux personnes n'ayant pas renouvelé leur abonnement.



№ 2

D. L.  
23 FEV 1964

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA  
**STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES**  
DU  
LANGUEDOC-ROUSSILLON

MONTPELLIER - 16, Rue de la République - TEL. M2 58-72

POUR ÉVITER LE **MONILIA**



D. L.  
23 FEV 1964

P33

**TRAITEZ !**